

SOBRE LAS VACUNAS

La **Estrategia de Vacunación Escolar 2025** es una iniciativa del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Salud que busca proteger a la población en edad escolar en Chile contra enfermedades inmunoprevenibles. Es un programa programático y obligatorio establecido por el Ministerio de Salud y no requiere autorización previa de los apoderados o tutores, aunque estos deben ser informados.

El objetivo principal de esta estrategia es disminuir la incidencia de enfermedades y muertes causadas por la difteria, el tétanos, la tos ferina (coqueluche) y el Virus del Papiloma Humano (VPH).

¿Por qué debo vacunar a mi hijo o hija?

Las vacunas protegen a la comunidad de enfermedades peligrosas que pueden tener complicaciones graves o secuelas, y provocar incluso la muerte. Algunas de estas enfermedades son muy poco frecuentes, debido precisamente, a la administración de las vacunas y campañas de vacunación.

¿Las vacunas pueden generar reacciones después de ser administradas?

Las personas pueden presentar algunas reacciones, en general leves y transitorias. Las más comunes son:

- Fiebre con temperatura mayor a 37,5° C.
- Inflamación, enrojecimiento, dolor o aumento de volumen en la zona de punción.
- Decaimiento.

Los síntomas pueden durar desde las primeras 24 horas hasta tres días. Si presentas otra manifestación o las reacciones se prolongan por muchos días, consulta a tu médico o acude al servicio de urgencia más cercano.

¿Puedo vacunar a mi hija o hijo si está enfermo?

Las vacunas no están contraindicadas cuando se presenta alguna de las siguientes manifestaciones:

- Fiebre menor a 38° C.
- Infecciones leves del tracto respiratorio.
- Congestión nasal.
- Diarreas leves.

Se debe posponer la vacunación si el estudiante presenta una enfermedad aguda SEVERA (como neumonía, meningitis, sepsis) o tiene fiebre mayor a 38,5°C axilar.

No deben vacunarse personas que hayan tenido una reacción alérgica SEVERA (anafilaxia) a algún componente de la vacuna o que hayan presentado un evento adverso grave después de una dosis anterior. o contraindicación diagnosticada por un médico.

¿Se puede recibir más de una vacuna al mismo tiempo?

Sí, utilizando distintas zonas de punción.

Cuidados post vacunación.

- ✓ En caso de fiebre ($>38^{\circ}\text{C}$) o dolor puede consumir analgésicos según indicación médica.
- ✓ Hidratarse de forma adecuada con un mínimo de 2 litros diarios.
- ✓ En caso de malestar en zona de punción como el dolor. Colocar compresas frías.

Si un estudiante no asiste al establecimiento educativo o por alguna razón no recibió la vacuna, puede acudir a un vacunatorio público o privado en convenio con la SEREMI de Salud del país.